

IVF utáni többes terhességek

Dr. Garamvölgyi György Ph.D.
Uzsoki utcai Kórház, Budapest

Magyarországon a születendő gyermekek 1.5 – 2 %-a IVF kezelést követően fogan. Az IVF kezelések kezdetektől sokat kritizált velejárója a többes terhességek számának növekedése. Az elmúlt 10 év fővárosi szülészeti statisztikája alapján megállapítható, hogy minden évben több iker és hármasier szülés volt. Az évenkénti esetek száma ikerterhességnél a duplájára növekedett, míg a hármasier-terhességek száma megháromszorozódott. A vizsgált időszakban 487 IVF utáni terhesség adatait elemezve megállapítható, hogy 212 esetben volt iker terhesség, 37 hármasier és 1 négyes-iker – terhesség. A négyes-iker terhesség redukcióra került. A koraszülési arány 30.6 % volt. A szinguláris terhességeknél 8.43 %-ban fordult elő koraszülés, míg ez a szám gemini terhességnél 31.3 %, hármasier-ikreknél 72.97 %. A hármasier-iker terhességnél megjegyzendő, hogy a <28.hétig lezajlott koraszülések aránya 10.8 %, míg a 28 – 32. hét közöttiek aránya 40.5 % volt. A terhességek kimenetelét tekintve az anyai életkornak nem volt szignifikáns szerepe, a 35 év felettiek adatai hasonlóak. A szülésvezetés adatai szerint szinguláris terhesség esetén 20.25%, gemini esetén 67.9 % és hármasier esetén 100 % volt a császármetszések aránya. Az összes IVF utáni terhességre számítva ez a szám 47%. Hármasier fogamzás felismerését követően a várandósok számára részletes felvilágosítást kell nyújtani a terhesség kihordásának kockázatairól, az újszülöttek esélyeiről, hogy megfontolt döntést tudjanak hozni a terhesség továbbviseléséről, illetve az esetleges redukcióról.