

Szimultán terhességek IVF kezelések kapcsán  
Dr. Zsolnai Csaba, Dr. Lintner Ferenc  
Szent János Kórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály

Szimultán terhesség áll fenn, ha egyidejűleg van jelen intrauterin és extrauterin, ektópiás terhesség is. A szimultán terhességek előfordulása régebben igen ritka volt, nagy statisztikák szerint kb. 30.000 terhességre jutott egy szimultán terhesség, az utóbbi időben, az asszisztált reprodukciós technikák elterjedését követően viszont egyre gyakrabban találkozunk vele, egyes külföldi szerzők 1 %-os gyakoriságot írnak le IVF technikával létrehozott terhességek kapcsán. Az idejében diagnosztizált szimultán terhességek ektópiás részének ellátást követően az intrauterin terhességek döntő hányada zavartalanul továbbfejlődik. 2008-ban osztályunk anyagában 8, IVF+ET technikával kialakult méhen kívüli terhességből 3 szimultán terhességnek igazolódott. A kórkép kórismézése az esetek egy részében nem könnyű, számtalan diagnosztikus problémát vet fel, súlyos esetben a nagyfokú hasüregi vérvesztés miatt életveszélyes állapotot is okozhat, ezért igen fontos, hogy gondoljuk rá, idejében diagnosztizáljuk, és idejében adekvát kezelésben részesítsük a beteget.